



SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG

CF 4756466

Nr. 17556 / 21.07.2020



ANUNT

Spitalul Municipal Campulung efectueaza testul RT-PCR SARS - CoV 2 care evidentiaza prezenta virusului si este o investigatie pentru diagnosticul timpuriu al infectiei virale cu SARS-CoV-2.

Pentru testare, se va preleva o proba de exsudat nazofaringian / orofaringian. Testul se efectueaza prin metoda Real -Time PCR.

Tariful unei testari RT-PCR este 200 lei. Achitarea taxei de catre solicitant se realizeaza in momentul in care se prezinta pentru prelevare.

Solicitarea (cererea) se face pe e-mailul spitalului sau in locatia unde se face recoltarea / cabinet ORL (spatiul special amenajat la intrarea in curtea spitalului). Solicitarea trebuie sa contina obligatoriu datele de contact ale persoanei (telefon, adresa de e-mail) si data rezultatului pentru persoanele care solicita testarea in vederea calatoriei in afara tarii. Solicitarile care nu contin aceste informatii nu vor primi raspuns.

Programarea datei/ orei de testare se va face de catre asistenta desemnata in termen util pentru ca persoana ce solicita testarea sa primeasca rezultatul in timp util **cu mentiunea ca prioritare sunt persoanele internate cat si cele simptomatice iar capacitatea de testare la solicitare poate varia in functie de numarul acestora.**

Solicitantul va fi contactat de catre personalul spitalului pentru a fi informat in legatura cu ora la care sa se prezinte pentru prelevarea probelor sau de indisponibilitatea testarii in intervalul solicitat.

Toate persoanele care se prezinta au obligatia sa poarte masca si sa pastreze distanta de minim 2 m fata de celelalte persoane.

Rezultatul probelor se va transmite personal solicitantului (in 24-48 ore, iar rezultatul probelor recoltate vineri se va transmite luni) iar daca acesta este neconcludent solicitantul va fi contactat de personal al spitalului din cadrul Laboratorului RT-PCR sau asistenta desemnata, pentru a se prezenta la o alta prelevare.

Inainte de testare cu cel putin 4 ore nu se consuma alimente / lichide.

Sunt contraindicate instilatiile nazale inainte de recoltarea probelor in vederea testarii.

Manager

Dr. Stanescu Ion Grigore

